

シロアリ

シロアリは基本的に光や風、雨などにさらされるとすぐに死んでしまうこともあります。そのため木材の中や、地中で暮らしているため生息を確認出来ることはほとんどありません。しかし、床下の木材や地中の中で生活し、こっそりと家を加害してしまふことがあります。また、冬眠をせずに越冬し、暖かい場所であれば冬でも問題なく行動できる虫なのです。特に現代の高気密、高断熱住宅や、床暖房、地熱を利用した住宅など冬でも床下が暖かい家については要注意です。

対策としては下図にあるように主に地中から侵入し木材に入り込み加害していく生態なので木部・土壌それぞれに残効する薬剤で施工し5年間の保障をさせていただきます。


また、シロアリとクロアリを混同してしまう方が多いですが、生物的には全くの別物です。



	シロアリ	黒アリ
変態	不完全変態(蛹にならない)	完全変態(蛹になる)
働きアリ		
羽アリ		


ヤマトシロアリ

群飛時期	活動温度	体長
4～5月頃 日中	6°C前後から開始 12～30°C前後	3.5～6.0mm




イエシロアリ

群飛時期	活動温度	体長
6～7月頃 夕方から夜間	10°C前後から開始 30～35°C前後	7.5～9.5mm



施工の流れ



被害状況によっては2F等床下以外の部分も施行が必要な場合がございます。ウッドデッキ・小屋等の屋外及び未施工部分については保障いたしません。点検時に床下全域に入れない場合は別途大工工事等が必要になることもございます。全域施工できない場合については5年保障はできません。